Urgomed®

PANSEMENT POUR PLAIES SUPERFICIELLES EXSUDATIVES ET BRÛLURES

Urgomed®

Pansements sous emballage individuel stérile conditionnés en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION nombre UCD/BOÎTE	GROUPAGE nombre UCD	GROUPAGE nombre BOÎTES
2940	Standard : 5 x 10 cm	10	400	40
2734	Moyen : 15 x 15 cm	10	80	8
5828	Grand : 20 x 20 cm	10	80	8

LABORATOIRES URGO ▪ 42 RUE DE LONGVIC ▪ 21300 CHENÔVE ▪ TÉL 03 80 54 50 00 ▪ FAX 03 80 44 74 52 ▪ www.urgomedical.fr

Urgomed®



Site donneur de greffe.

Brûlure superficielle.

Chirurgie dermatologique.

DESCRIPTION

Urgomed® est un pansement adhésif stérile, semi-perméable
COMPOSITION : Urgomed® est composé d'une masse hydrocolloïde appliquée sur un support polyuréthanne/non tissé.
PRÉSENTATION : Conditionnement individuel stérile.
MODE DE STÉRILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIÉTÉS

- **Urgomed**® est un pansement dérivé de la technologie hydrocolloïde, extra-mince, à support original polyuréthanne/non tissé, doté de fortes capacités de drainage. **Urgomed**® est tout spécialement adapté au recouvrement des plaies superficielles exsudatives.
- **Urgomed**® est translucide et permet la surveillance de la plaie.
- **Urgomed**® est imperméable : la plaie, tout en continuant de respirer, est protégée des contaminants extérieurs et la poursuite des bains et des douches est possible.
- Le renouvellement d'**Urgomed**® est totalement indolore.

INDICATIONS

INDICATIONS : Soins locaux des brûlures du 2nd degré superficiel, des sites donneurs de greffe et plus généralement des plaies superficielles exsudatives.
CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser **Urgomed**® sur des plaies infectées ou sur des brûlures profondes.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- **1- Préparation de la plaie**
  - Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles :
  . Brûlure : désinfection à l'aide d'une solution antiseptique. Excision des phlyctènes, et rinçage au sérum physiologique.
  . Site donneur de greffe : procéder à une hémostase immédiate du site par compresse imbibée de sérum physiologique.
  . Dermabrasion : retirer tout caillot ou débris nécrosé, désinfecter soigneusement la plaie et rincer au sérum physiologique.
- **2 - Application du pansement**
  - Assécher la peau à l'aide d'une compresse sèche.
  - Appliquer **Urgomed**® en laissant une marge de 2 à 3 cm en peau saine.
  - Réaliser un pansement secondaire si nécessaire à l'aide d'une bande peu serrée (enfant, zone de frottement, mains...)
  . Pour les sites donneurs de greffe : recouvrir de 1 à 2 compresses et appliquer une bande élastique moyennement serrée.
- **3 - Suivi de renouvellement**
  - **Urgomed**® sera contrôlé à 48 H.
  - Il sera systématiquement renouvelé en cas de brûlure, site donneur de greffe ou en cas de plaie très exsudative (saturation ou décollement de la plaque).
  - Par la suite, le pansement sera renouvelé tous les 2 à 3 jours en fonction de l'exsudation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- En cas d'infection, l'utilisation d'**Urgomed**® doit être suspendue.
- Durée de conservation : 3 ans.

STATUT RÉGLEMENTAIRE

Dispositif médical.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). Tarif LPPR=PLV (Prix Limite de Vente)
Remboursé Sécurité Sociale à 65 %.

CE 0459

CICATRISATION

09/2008

URGO